

《アセモトール 100mL》

ミョウバン（硫酸アルミニウムカリウム）	1g
ホウ砂	2g
亜鉛華（酸化亜鉛）	7g
タルク	7g
サリチル酸	0.5g
80%エタノール（消毒用エタノール）	10mL
グリセリン	4mL
ハッカ油	0.1mL
<hr/>	
加水全量	100mL

＜調整法＞

- ① 精製水適量（50mL程度）を入れた透明外用容器にミョウバンを加え、溶解する。
- ② ①にホウ砂、酸化亜鉛、タルクを加え、溶解する。
- ③ ビーカー（②とは別の容器）にエタノールを入れ、そこへサリチル酸を加えて溶解する。
- ④ ③にグリセリンとハッカ油を加える。
- ⑤ ②の透明外用容器に④を加えて、よく攪拌する。

＜使用方法＞

- ご使用前によく振ってください。  
あせも等におぬりください。

≪【内服】ハリゾン内用液（1日分）≫

ハリゾンシロップ 100mg/mL

3mL

<調整法>

①ハリゾン内用液 1日分 3mL に対し、精製水 12mL を加え、全量が 15mL になるように希釈する。（5倍希釈）

<使用方法>

冷蔵庫に保存してください。

よく振ってください。

口腔内に含ませ、広く行き渡らせてください。

約 15～30 秒たちましたら、そのまま飲み込んでください。

≪【含嗽】ハリゾン含嗽液（1日分）≫

ハリゾンシロップ 100mg/mL

4mL

<調整法>

①ハリゾン内用液 1日分 4mL に対し、精製水 36mL を加え、全量が 40mL になるように希釈する。（10倍希釈）

<使用方法>

冷蔵庫に保存してください。

よく振ってください。

口腔内に含ませ、広く行き渡らせてください。

約 15～30 秒たちましたら、吐き出してください。

《10 倍希釈ポピラール液》

ポピラール消毒液 10%	1mL
精製水	9mL
<hr/>	
加水全量	10mL

＜調整法＞

- ① ポピラール消毒液 10%1mL に対し、精製水 9mL を加え、全量が 10mL になるように希釈する。(10 倍希釈)

＜使用方法＞

飲まないでください。

使用期限は未開封で処方日から 2 ヶ月です。

開封後 1 ヶ月以内にお使いください。