

大腸癌

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐 リスク
Cmab	セツキシマブ	250mg/m ² (初回400mg/m ²)	60分 (初回120分)	day1	7日	最小
Pmab	パニツムマブ	6mg/kg	60分	day1	14日	最小
CPT-11	イリノテカン	100mg/m ²	90分	day1.8.15	35日	中
Cmab+CPT-11	セツキシマブ イリノテカン	250mg/m ² (初回400mg/m ²) 150mg/m ²	60分 (初回120分) 90分	day1,8,15,22,29, 36,43 day1.15.29	49日	中
Pmab+CPT-11	パニツムマブ イリノテカン	6mg/kg 150mg/m ²	60分 90分	day1 day1	14日	中
mFOLFOX6	レボホリナート Ca オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	120分 120分 急速静注 46時間	day1 day1 day1 day1	14日	中
Bmab+mFOLFOX6	ベバシズマブ レボホリナート Ca オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	5mg/kg 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	30分 (初回90分,2回目60分) 120分 120分 急速静注 46時間	day1 day1 day1 day1 day1	14日	中
FOLFIRI(75歳以下)	レボホリナート Ca イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	120分 90分 急速静注 46時間	day1 day1 day1 day1	14日	中
FOLFIRI(高齢)	レボホリナート Ca イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	200mg/m ² 120mg/m ² 300mg/m ² 2000mg/m ²	120分 90分 急速静注 46時間	day1 day1 day1 day1	14日	中
Bmab+FOLFIRI (75歳以下)	ベバシズマブ レボホリナート Ca イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	5mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	30分 (初回90分,2回目60分) 120分 90分 急速静注 46時間	day1 day1 day1 day1 day1	14日	中
Cmab+FOLFIRI	セツキシマブ レボホリナート Ca イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	250mg/m ² (初回400mg/m ²) 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	60分 (初回120分) 120分 90分 急速静注 46時間	day1 day1 day1 day1 day1	14日	中
RAM+FOLFIRI	ラムシルマブ レボホリナート Ca イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	8kg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	60分 120分 90分 急速静注 46時間	day1 day1 day1 day1 day1	14日	中
AFL+FOLFIRI	アフリベルセプト レボホリナート Ca イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	4mg/kg 200mg/m ² 180mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	60分 120分 90分 急速静注 46時間	day1 day1 day1 day1 day1	14日	中
sLV5FU2	レボホリナート Ca フルオロウラシル フルオロウラシル	200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	120分 急速静注 46時間	day1 day1 day1	14日	小

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
Bmab+sLV5FU2	ベバシズマブ レボホリナート Ca フルオロウラシル フルオロウラシル	5mg/kg 200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2	30分 (初回90分,2回目60分) 120分 急速静注 46時間	day1 day1 day1 day1	14日	小
5FU+LV	レボホリナート Ca フルオロウラシル	250mg/m2 600mg/m2	120分 急速静注	day1 day1	6週投与2週休薬	小
Bmab+Cape	ベバシズマブ カペシタビン	7.5mg/kg C法	30分 (初回90分,2回目60分) 内服	day1 day1-14	21日	最小
CapeOX	カペシタビン オキサリプラチン	C法 130mg/m2	内服 120分	day1-14 day1	21日	中
Bmab+CapeOX	ベバシズマブ カペシタビン オキサリプラチン	7.5mg/kg C法 130mg/m2	30分 (初回90分,2回目60分) 内服 120分	day1 day1-14 day1	21日	中
CapeIRI	カペシタビン イリノテカン	1600mg/m2 200mg/m2	内服 90分	day1-14 day1	21日	中
Bmab+CapeIRI	ベバシズマブ カペシタビン イリノテカン	7.5mg/kg 1600mg/m2 200mg/m2	30分 (初回90分,2回目60分) 内服 90分	day1 day1-14 day1	21日	中
SOX	S-1 オキサリプラチン	80mg/m2 130mg/m2	内服 120分	day1-14 day1	21日	中
IRIS(4週毎)	S1 イリノテカン	80g/m2 125mg/m2	内服 90分	day1-14 day1.15	28日	中
IRIS(3週毎)	S1 イリノテカン	80g/m2 150mg/m2	内服 90分	day1-14 day1	21日	中
Bmab+FOLFOXIRI	ベバシズマブ レボホリナート Ca イリノテカン オキサリプラチン フルオロウラシル	5mg/kg 200mg/m2 165mg/m2 85mg/m2 3200mg/m2	30分 (初回90分,2回目60分) 120分 60分 120分 48時間	day1 day1 day1 day1 day1	14日	高
ニボルマブ(2週毎) ※ MSI-Hを有する結腸・直腸癌	ニボルマブ	240mg/body	30分	day1	14日	最小
S1+Bmab	S-1 ベバシズマブ	80~120mg/body 5mg/kg	内服 30分 (初回90分,2回目60分)	day1-28 day1,15,29	42日	最小
TAS102+Bmab	TAS102 ベバシズマブ	70mg/m2 5mg/kg	内服 30分 (初回90分,2回目60分)	day1-5、day8- day1,15	28日 14日	最小
ニボルマブ(4週毎) ※ MSI-Hを有する結腸・直腸癌	ニボルマブ	480mg/body	30分	day1	28日	最小
エンコラフェニブ+ ビニメチニブ+ セツキシマブ	エンコラフェニブ ビニメチニブ セツキシマブ	300mg/回 45mg/回 250mg/m2 (初回400mg/m2)	内服 内服 60分 (初回120分)	毎日 毎日 day1	7日	最小
エンコラフェニブ+ セツキシマブ	エンコラフェニブ セツキシマブ	300mg/回 250mg/m2 (初回400mg/m2)	内服 60分 (初回120分)	毎日 day1	7日	最小
フェスゴIN	ヘルツムマブ1200+トラスツスマブ600+ホルヒアロニダーゼ3000IU		皮下	day1(初回)	21日毎	最小

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐 リスク
フェスゴMA	ヘルツムマブ600+トラスツスマブ600+ホルヒアロニダーゼ2000IU		皮下	day1(2回目以降)	21日毎	最小